Administración de Medicación por Inyección Intravenosa

Introducción

Su infusión se administrará conectando una jeringa llena de medicación a su catéter. Se le enseñará a inyectar la medicación durante un cierto período de tiempo.

Suministros

• Jeringa con medicación • Jeringas de solución salina y heparina • Toallitas con alcohol • Reloj con segundero o "temporizador de segundos" • Jabón o gel a base de alcohol para lavarse las manos

Pasos

1. Saque su medicación del refrigerador 1-2 horas antes de necesitar infundirla. Permita que alcance la temperatura ambiente.
2. Prepare un área de trabajo limpia.
3. Reúna sus suministros.
4. Lávese las manos como le enseñó su enfermera de atención domiciliaria.
5. Desinfecte el extremo del dispositivo de acceso sin aguja en su catéter con la toallita con alcohol.
6. Proceda con el enjuague previo a la inyección. (Vea "Educación del Paciente: Enjuague de su Catéter").
7. Retire la cubierta protectora del extremo de la jeringa de medicación.
8. Conecte la jeringa al dispositivo sin aguja girando en el sentido de las agujas del reloj.
9. Inyecte lentamente la medicación como le enseñó su enfermera de atención domiciliaria. Su inyección debe administrarse durante minuto(s). Use un reloj para cronometrar la inyección.
10. Retire la jeringa de inyección del dispositivo sin aguja.
11. Proceda con el enjuague posterior a la infusión. (Vea "Educación del Paciente: Enjuague de su Catéter").

Notas e Instrucciones

1. Nunca enjuague ni inyecte forzosamente ninguna medicación en su IV. Si tiene dificultades para enjuagar o infundir su medicación, deténgase y llame a su enfermera de salud domiciliaria para obtener ayuda.