SERVICIOS DE INFUSIÓN

Su Catéter Midline para Terapia Intravenosa en Casa

Introducción

Su médico ha recomendado medicamentos intravenosos (IV) como parte de su tratamiento. • Para administrarle estos medicamentos intravenosos (también llamados infusiones), su médico ha ordenado la inserción de un dispositivo llamado catéter intravenoso midline. Un catéter midline es un tubo delgado hecho de un material muy suave y flexible. Puede tener diferentes tamaños, pero generalmente mide alrededor de seis (6) pulgadas de largo. • El catéter midline se coloca en una vena de su brazo (posiblemente en el mismo lugar donde le extraen sangre en el consultorio de su médico). Una vez insertado, puede permanecer en su lugar hasta 30 días si se maneja adecuadamente. • Su catéter intravenoso midline debe ser cuidado para evitar infecciones o daños. Por favor, lea la siguiente información y pregunte a su enfermera de atención domiciliaria o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre su catéter IV.

Puntos Importantes Sobre Su Catéter Midline

• Su catéter será insertado por una enfermera especialmente capacitada o por un médico con experiencia en la colocación de estos dispositivos. Utilizarán procedimientos estándar de control de infecciones para prevenir cualquier infección. • Su catéter puede permanecer en su lugar hasta 30 días. Si la terapia continúa después de ese tiempo, es posible que el catéter deba ser cambiado. Las instrucciones específicas para el reemplazo rutinario de su catéter serán obtenidas de su médico. • Su catéter debe ser manejado correctamente durante su terapia para prevenir infecciones o irritaciones. El catéter no puede caerse, pero puede ser accidentalmente extraído si no está asegurado adecuadamente o si se maneja incorrectamente. • El medicamento se inserta a través del catéter conectando el tubo IV al conector sin aguja en el extremo del catéter. Su enfermera de atención domiciliaria le enseñará a hacerlo correctamente, o alguien lo hará por usted. © 27/11/2020 Página 1 de 2 PE-CATH-2 Manual de Educación del Paciente Catéter Midline • Si se trata correctamente con medicamentos de "lavado" de solución salina y heparina, su catéter no debería obstruirse o bloquearse. Informe a su enfermera de atención domiciliaria o farmacéutico de inmediato si el catéter no está funcionando correctamente. • Puede usar su brazo para actividades diarias. Sin embargo, evite cualquier actividad pesada o físicamente desafiante que cause movimiento del catéter. Es importante que el vendaje de su catéter permanezca seco e intacto durante todas las actividades, y que el catéter esté asegurado en su lugar con cinta estéril y/o un dispositivo de sujeción para evitar la extracción accidental.

Signos o Síntomas a Reportar a Su Enfermera o Farmacéutico

• Dolor o sensibilidad alrededor de su catéter • Dolor o sensibilidad cuando comienza su infusión • Hinchazón o inflamación alrededor de su catéter o en cualquier parte de su brazo • Enrojecimiento o secreción alrededor de su catéter • Fiebre • Si no puede lavar el catéter, infusión "lenta" o lenta, e incapacidad para extraer sangre del catéter. • Sangrado • Fuga de medicamento del sitio del catéter.

Notas

1. Lavarse las manos con frecuencia ayuda a prevenir infecciones.
2. Evite el movimiento del catéter en todo momento.

3. Siempre limpie el dispositivo de acceso sin aguja con una almohadilla de alcohol antes de conectar el tubo de administración IV durante un mínimo de 15 segundos.
4. Evite mojar el catéter o el vendaje.
5. Evite los baños de tina. © 27/11/2020 Página 2 de 2 PE-CATH-2