Document: cuidado vital SERVICIOS DE INFUSIÓN

Su Catéter PICC para Terapia Intravenosa en el Hogar

Introducción

Su médico ha recomendado medicamentos intravenosos como parte de su tratamiento. Para administrarle estos medicamentos intravenosos (también llamados infusiones), su médico ha ordenado la inserción de un dispositivo llamado catéter central de inserción periférica o catéter intravenoso PICC. Un catéter PICC es un tubo delgado hecho de un material muy suave y flexible. Puede tener diferentes tamaños, pero generalmente mide alrededor de 20 pulgadas de largo. El catéter PICC se coloca en una vena por encima del pliegue de su brazo (el mismo lugar donde le pueden extraer sangre en el consultorio de su médico). La punta del PICC se colocará en una vena que termina aproximadamente a una (1) pulgada antes de su corazón. PICC Diagrama que muestra una línea PICC ŁŁ CancerHelp UK

Puntos Importantes sobre su Catéter

• Los PICC pueden mantenerse en su lugar durante el tiempo que sea necesario para completar su terapia de infusión. Las siguientes son recomendaciones para mantener su PICC libre de complicaciones. • Su enfermera colocará un nuevo vendaje estéril sobre el sitio semanalmente. Mantenga el sitio limpio y seco. Si el vendaje comienza a desprenderse o si el sitio se moja, comuníquese con su enfermera de atención domiciliaria para que puedan reemplazar el vendaje. • Siempre lávese las manos o use desinfectante de manos a base de alcohol antes de enjuagar su catéter o administrar su medicamento. Recuerde 'frotar el conector sin aguja' del catéter con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos antes de administrar medicamentos o enjuagues. • Está bien continuar con la mayoría de las actividades habituales, pero evite el movimiento repetitivo continuo o levantar objetos pesados con el brazo del PICC. • Está bien ducharse, pero su sitio PICC debe estar cubierto para protegerlo de mojarse. No nade ni sumerja su brazo en agua de baño mientras el PICC esté en su lugar. • Revise su temperatura diariamente, ya que a menudo es el primer signo de que el sitio PICC necesita una evaluación adicional. Informe a su médico si su temperatura es de 100.4 °F o superior. • Nunca use tijeras ni objetos afilados alrededor de su línea PICC ni para quitar el vendaje, ya que esto puede resultar en un corte accidental en la línea. • Si su línea PICC se rompe accidentalmente, aplique inmediatamente una pinza por encima del corte (más cerca del sitio de inserción) y llame a su enfermera de atención domiciliaria.

Signos o Síntomas para Informar a su Enfermera o Farmacéutico

• Sangrado (más grande que el tamaño de una moneda de diez centavos) o supuración del sitio PICC • Temperatura de 100.4 °F o superior • Un vendaje PICC suelto, mojado o sucio • Un catéter que se vuelve más difícil de enjuagar o se siente 'obstruido' • Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo del PICC o alrededor del sitio PICC • Tirones accidentales en el PICC que aumentan la cantidad de catéter que está fuera de su cuerpo • Zumbido o silbido en los oídos al infundir su medicamento • Palpitaciones cardíacas, mareos o aturdimiento • Cualquier otro síntoma inusual o nuevo